

HET METEN VAN DE TEMPERATUUR



U Heeft Nodig:

- * Plastic digitale thermometer
- * Kwik thermometer

De temperatuur van uw paard wordt beschouwd als één van de meest belangrijke vitale tekenen, omdat het elke kleine verstoring in de algehele gezondheid opmerkt.

De temperatuur van uw paard kan stijgen door verschillende redenen en is op zich geen reden tot alarm.

Als uw paard opgewonden is, pijn heeft, ziek is, net getraind is, in een warm en vochtig klimaat staat of nog jong is, kan zijn temperatuur verhoogd zijn.

Daarom is een verhoging van 2 graden geen reden voor ongerustheid maar moet wel worden opgemerkt.

Bij een verhoging van 4 graden bij uw paard dient verdere actie te worden ondernomen.

Het is belangrijk om de gemiddelde temperatuur van uw paard te weten voordat er een crisis ontstaat.

Het is handig om een paar opeenvolgende dagen de temperatuur van uw paard te meten, en daarna 1x per week voor een goed gemiddelde.

Hierdoor raakt uw paard ook gewend aan deze handeling.

Doe elk medisch onderzoek bij uw paard op een rustige comfortabele wijze, het zorgt voor een binding tussen u en uw paard en geeft u veel gemak bij alarmsituaties.

De temperatuur van uw paard nemen is een simpele procedure.

Het paard dient vast te staan of te worden vastgehouden door een helper.

Wij adviseren u om een veterinair thermometer te gebruiken omdat u deze d.m.v. Het touwtje aan de staart vast kunt maken.

Een kwikthermometer is accurater als een digitale thermometer omdat het nodig is om deze thermometer verder in het rectum te doen dan een digitale.

Ook werkt een digitale op batterijen en u zult zien dat als u deze nodig heeft, de batterijen leeg zijn, wij adviseren om beide thermometers te hebben.

Gebruikt u een kwikthermometer schud deze dan eerst tot onder 35 graden Celsius.

Smeer de thermometer lichtjes in met vaseline (op kamertemperatuur) of doe er een beetje spuug op.

Het is van belang om er niet te veel vaseline op te doen omdat dit de thermometer zal isoleren en u geen goede meting krijgt.

Ga aan de zijkant van uw paard staan, kijkend naar de staart.

Pak de staartwortel en doe deze aan naar de zijkant.

Pak de staart niet vast bij de haren.

Doe de thermometer voorzichtig in de anus, dit gaat met een licht draaiende beweging en in opwaartse richting.

Bevestig de clip aan de staart en begin met de timing.

Een kwikthermometer dient u altijd 3 minuten te laten zitten, blij gedurende deze tijd bij uw paard om hem gerust te stellen en comfortabel te houden.

Verwijder na deze tijd de thermometer en lees hem af.

Maak de thermometer na gebruik schoon met alcohol voordat u hem weer opbergt.

Een volwassen paard in rust heeft een normale temperatuur van 37.5 graden Celsius en 38 graden Celsius.

Koorts begint bij 39 graden Celsius.

Als de temperatuur hoger is als 40 graden Celsius neem dan direct contact op met uw dierenarts.

Een teken van een verhoogde temperatuur is ook koud of gedeeltelijk zweten.

Voor jonge veulens ligt de normale lichaamstemperatuur gemiddeld iets hoger.

Een pasgeboren veulen heeft een temperatuur tussen de 38.5 graden Celsius en 39.5 graden Celsius.

Een veulen tot 1 maand heeft een temperatuur tussen de 37.2 graden Celsius en 38.9 graden Celsius.

